

# Een opknappbeurt voor het Beethovenpark - beplanting

## Heestervakken - bodem

Deze heesters staan in de plantvakken tussen de flats. Het zijn lage soorten. De hoogte loopt van 20 cm tot 1 m. Ze staan hier op volgorde van hoogte, van laag naar hoog.



**Hedera helix**  
klimop



**Euonymus fortunei 'Tustin'**  
Japanse kardinaalshoed



**Potentilla fruticosa 'Dart's Cream'**  
ganzerik



**Deutzia gracilis 'Nikko'**  
bruidsbloem



**Clethra alnifolia 'White Spire'**  
schijnels



**Hypericum inodorum 'Rheingold'**  
hertshooi



**Forsythia 'Maree d'Or'**  
Chinees klokje



**Spiraea japonica 'Dart's Red'**  
spierstruik



**Rhododendron 'Beethoven'**  
rododendron



**Spiraea betulifolia 'Tor'**  
spierstruik



**Chaenomeles 'Crimson and Gold'**  
dwergkwee



**Philadelphus 'Manteau d'Hermine'**  
boerenjasmijn



**Spiraea fritschiana 'Pink Parasols'**  
spierstruik



**Symphoricarpos doorenbosii 'Magic Berry'**  
sneeuwbes



**Viburnum opulus 'Compactum'**  
Gelderse roos



**Ribes alpinum 'Schmidt'**  
alpenbes

## Heestervakken - solitaires

Op een paar plekken staat een hogere struik boven de lage struiken.



**Cornus mas gele kornoelje**  
Inheemse struik. Zeer vroege bloeier. Belangrijk voor insecten in het vroege voorjaar.



**Cornus sanguinea rode kornoelje**  
Inheemse struik. Bloei in mei/juni, soms nabloei. Rode twijgen in de winter.



**Rosa rubiginosa egelantier**  
Inheemse struik. Bloei in juni/augustus. Rode botfels. Blad ruikt naar frisse appeltjes.



**Syringa 'Minuet' sering**  
Lage sering. Bloei in mei. Heerlijke geur.

## Aanvullingen in de bosrand

De beplanting onder de bomen is op de meeste plekken laag, maar soms is er een dichter gedeelte. Om de biodiversiteit te verhogen vullen we de beplanting aan met een aantal inheemse soorten.



**Prunus spinosa sleedoorn**  
Inheemse stekelige struik. Vroege bloeier. Blauwe vruchten.



**Euonymus europaeus kardinaalsmuts**  
Inheemse struik. Opvallende bessen en herfstkleur.



**Corylus avellana hazelnoot**  
Inheemse struik. Vrukt is de bekende noot.



**Cornus sanguinea rode kornoelje**  
Inheemse struik. Bloei in mei/juni, soms nabloei. Rode twijgen in de winter.



**Lonicera periclymenum wilde kamperfoelie**  
Inheemse klimplant. Bloei juni/oktober. Sterke zoete geur in de avonduren.

## Bollenmengsels



**Voorschoten**



**Weesp**



**Bussum**



**Alkmaar**

## Kruidenmengsels

Op sommige plekken geven het bloemengrasland een extra boost door het inzaaien van een mengsel meerjarige kruiden. Die mengsels zijn afgestemd op de plek, bijvoorbeeld schaduw of vocht. Voor het uiteindelijke resultaat is geduld nodig; ongeveer drie jaar.


## Bomen



**Fruitbomen**  
Malus domestica 'Jasappel', 'Sterappel' en 'Lemoen'  
Deze soorten zijn geschikt om elkaar te bestuiven.



**Sorbus aucuparia gewone lijsterbes**  
Hoogte: 10-15 m  
Bloei: mei/juni, wit  
Vrukt: oranje-rood  
Herfst: geel/oranje/rood



**Prunus avium zoete kers**  
Hoogte: 15 m  
Bloei: april, wit  
Vrukt: donkerrood  
Herfst: geel/rood



**Prunus padus gewone vogelkers**  
Hoogte: 8-12 m  
Bloei: april, wit, geurend  
Vrukt: zwart



**Malus sylvestris wilde appel**  
Hoogte: 7-9 m  
Bloei: april/mei, roze/wit  
Vrukt: groengeel, 3-4cm



**Mespilus germanica mispel**  
Hoogte: 6-8 m  
Bloei: mei/juni, wit  
Vrukt: bruin, 4-5 cm